

LeniScar

Tratamiento de silicona hidratante y antioxidantes con vitaminas C y E en formato stick



Tratamiento de cicatrices

Anscare LeniScar Silicone Stick es un tratamiento tópico de silicona fácil de usar destinado a disminuir las cicatrices hipertróficas y los queloides caracterizados por una apariencia elevada o decolorada. LeniScar crea una película delgada invisible y transparente que ayuda a mantener el equilibrio de humedad de la piel y proporciona una barrera protectora óptima para que la herida cicatrice.

» Aplicaciones:

Prevención de cicatrices hipertróficas y queloides resultantes de lesiones quirúrgicas, cesáreas, quemaduras, cortes, raspaduras, acné, picaduras de insectos, etc.



CE Producto sanitario Clase I

Anscare™

En Anscare nos dedicamos a ayudar a los pacientes a volver a su vida normal de la forma más rápida posible. Para hacerlo, aprovechamos la innovación en la ciencia de materiales para mejorar la curación en cada etapa del cuidado de heridas.

Con el respaldo de BenQ Materials y la experiencia interna de Anscare, desarrollamos productos avanzados de grado médico que cubren soluciones de hemostasia clínica, manejo de heridas y cuidado de cicatrices.

Beneficios


- » Tratamiento hidratante de larga duración de 12 horas.
- » Fórmula avanzada de silicona con vitaminas C y E.
- » Invisible, usable debajo del maquillaje.
- » Gestión innovadora de cicatrices, no más geles o cremas desordenadas.
- » Ideal para cicatrices en la cara, el cuello, las articulaciones, los codos, los tobillos y el área de la cicatriz cubierta de cabello.




● ¿Cómo funciona LeniScar?

Para evitar que una herida dérmica subyacente progrese a una herida cutánea, la epidermis y el estrato córneo juegan un papel importante*. El estrato córneo forma una barrera para proteger el tejido subyacente de la deshidratación. LeniScar proporciona una barrera protectora óptima para la cicatrización.


» La terapia de silicona mejorada proporciona una función de barrera de agua efectiva y a largo plazo.



» La función de barrera de agua de la epidermis y el estrato córneo no se restablece.




» Aplicar LeniScar para ayudar a la cicatrización de heridas en un perfecto equilibrio hídrico



Los estudios** demuestran que las vitaminas C y E antioxidantes tópicas pueden proteger eficazmente a los queratinocitos del daño inducido por los rayos UV-B. LeniScar con fórmula de vitamina C y E puede absorber la luz en el espectro UVB.

* Reg. rep. herida {201 l} 19:Sl 6--S21

**Acta Derm Venereol {Stockh} {1996} 76:264-2681
MolecularCarcinogenesis {2002} 34:121-130




» Instrucciones de uso


1. Asegúrese de que el área de la cicatriz esté limpia y seca antes de cada aplicación.
2. Gire la barra de silicona LeniScar unos 2 mm hacia arriba.
3. Aplique LeniScar Silicone Stick sobre toda la cicatriz en 3-4 veces en una única dirección.

Repita 2-3 veces al día durante 8-12 semanas consecutivas o hasta que la cicatriz deje de responder. Para quitar, simplemente lave con un jabón suave o un limpiador neutro.


SP-200-1 (9.2g)



Gran cicatriz



Lesión de cirugía



Cesárea

SP-200-2 (4.0g)



Cicatriz menor